

# ENQUÊTE PARTICIPATIVE

CONTRIBUER

À LA  
CONNAISSANCE

***EPHIPPIGER PROVINCIALIS* (YERSIN, 1854)**  
L'Ephippigère provençale, la Boudraga

# ENQUÊTE PARTICIPATIVE

## *EPHIPPIGER PROVINCIALIS* (YERSIN, 1854)

### L'Ephippigère provençale, la Boudraga



## Identité



*Ephippiger provincialis* (Yersin, 1854)  
L'Ephippigère provençale

Tettigoniidae  
Bradyporinae

Habitats : pelouses sèches, friches, maquis, garrigues, cultures extensives


Altitude : 0 - 1 150 m

Période d'apparition des adultes : fin mai à mi-octobre en fonction des endroits et de l'altitude

**Statuts** Espèce menacée, classée «VU : Vulnérable» sur la liste rouge des orthoptères de Provence-Alpes-Côte d'Azur  
Remarquable ZNIEFF

## Répartition

**Objectifs** : actualiser et ajouter de nouvelles mailles !



## Où et comment chercher ?



Les adultes sont à rechercher dans les habitats favorables entre juin et septembre.

La répartition régionale de cette espèce est lacunaire. Elle est à rechercher dans tous les habitats favorables situés dans son aire d'occurrence : sur les stations historiques mais aussi entre les différentes populations connues.

Plus précisément, deux stations anciennes sont à actualiser dans le Var : sur le Plan des vaches (Plan-d'Aups-Sainte-Baume) et sur l'île de Port-Cros (Hyères).

De plus, il existe de nombreuses zones vides d'observation au sein de son aire de répartition : dans le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume (de Riboux à Evenos), le long des vallées de l'Issole et du Gapeau, au nord de la Provence Verte (de Carcès à Pourrières), dans les calanques et les collines de Marseille et de ses alentours.



# ENQUÊTE PARTICIPATIVE

## *EPHIPPIGER PROVINCIALIS* (YERSIN, 1854)

### L'Ephippigère provençale, la Boudraga

#### Recherche



Attention, les Ephippigères sont très variables et peuvent avoir différentes teintes de couleur, du vert feuille au jaune paille en passant par le rose et le gris.

Dans l'aire d'occurrence de l'Ephippigère provençale, il est difficile de la distinguer de l'Ephippigère des vignes (*Ephippigere diurnus* Dufour, 1841) et de l'Ephippigère terrestre (*Ephippiger terrestris* Yersin, 1854) qui peuplent les mêmes milieux.

De ce fait, la manipulation des individus ou une photo très précise des critères de détermination fournis ci-dessous est indispensable pour la reconnaissance de l'espèce. Une photo de l'habitat peut également être utile.

La stridulation des mâles adultes est un bon moyen pour détecter la présence d'une Ephippigère.



Les mâles possèdent des cerques triangulaires à base large avec une forte dent basale et une dent apicale.



Les femelles adultes se reconnaissent des autres Ephippigères par la présence de deux gros bourrelets latéraux au niveau du 7ème sternite.



